

Når/hvor lenge bør barnet være hjemme fra skolen ved sykdom?

Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter på skolen, og barnet bør være feberfritt.

To hovedfaktorer som bør vurderes

- 1: Hensynet til barnet selv.
- 2: Hensynet til de andre elevene, smittefare.

Feber: Kroppstemperaturen kan normalt variere hos barn. Temperatur mer enn 37,5 ° om morgenen og 38 ° på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt.

Diaré med eller uten oppkast: Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til skolen 48 timer etter at de har blitt symptomfrie.

Oppkast: Barnet holdes hjemme til allmenntilstanden er normal og minimum 48 timer med symptomfrihet.

Forkjølelse: Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå på skolen når allmenntilstanden tilsier det.

Lus: Det er anbefalt at barn med lus holdes hjemme fra skolen til lusekur er tatt. De kan gå på skolen dagen etter gjennomført kur.

Øyekatarr: Ut fra dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at skolebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt.