

Sykdom hos barna

Informasjon til foreldre og foresatte til elever ved Tunballen skole

Når en skal vurdere om barnet kan komme på skolen eller ikke, er det to hensyn en må ta. Det ene er hensynet til barnets selv. Det andre er smittevernhensyn. Et sykt barn som ikke kan delta i skolens daglige aktiviteter, vil ha det bedre hjemme i fred og ro.

Spredning av smitte i skolen forbygges best ved å ha gode hygienerutiner. Håndhygiene er svært viktig. Vi oppfordrer alle til å vaske hender med varmt vann og såpe når de kommer til skolen, for å redusere risikoen for smittespredning mellom hjem og skole.

Det er også viktig at skolen får beskjed hvis barnet har fått smittsomme sykdommer/tilstander slik at vi kan sette i gang med forbyggende tiltak for å hindre smitte.

Nedenfor er det satt opp noen vanlige sykdommer hos barn og informasjon om barnet kan komme på skolen eller ikke. Oversikten er laget i samråd med kommunelegen og bygger på folkehelseinstituttets anbefalinger om når syke barn bør holdes hjemme.

Sykdom	Kan barnet på skolen?
Almenntilstand	Almenntilstanden til barnet vil alltid være avgjørende for om barnet kan være på skolen, uavhengig av smittefare eller ikke. Barnet må være i form til å delta i det daglige opplegget og aktivitetene inne og ute.
Diare og oppkast	Barnet må være hjemme i 48 timer etter at de har hatt siste løse avføring eller oppkast.
Øyekatarr (Konjunktivitt)	Ved kraftig pussdannelse må barnet være hjemme til pussdannelsen har avtatt eller til dagen etter at behandling er igangsatt. Ved mild/moderat pussdannelse kan barnet komme.
Brennkopper	Barnet kan gå på skolen når sårene er under kontroll slik at det ikke er fare for at den smittsomme væsken kan komme i kontakt med andre barn. Dette kan i noen tilfeller ivaretas gjennom god tildekking med plaster. Men i noen tilfeller får en ikke det til og da må sårene være tørre. Hvis medisinerings er igangsatt, kan barnet komme på skolen dagen etter påbegynt behandling.
Vannkopper	Kan komme på skolen når utslettet har begynt å tørke inn.
Hodelus	Kan komme på skolen når barnet har begynt på lusekur.
Mark i magen	Barnet kan komme på skolen når behandling er igangsatt.
Meslinger	Må være hjemme minst 4 dager etter at utslettet er brutt ut.
Feber	Av hensyn til barnet selv bør barnet være hjemme til det er feberfritt.
Kikhoste	Ved mistanke om kikhoste må lege kontaktes for vurdering.